

医薬部外品 販売名 マイクロラスサン1000mL

成分・分量

亜塩素酸水 1.25g/100mL
(添加物として0.1mol/L リン酸緩衝液使用)

ご使用に際して、この容器の注意書きをよくお読みください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

- (1) 人体に使用しないこと (2) 噴霧で使用しないこと
- (3) 酸性の製品やその他の製品と混合や併用しないこと

 **相談すること** 次の場合は、使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 誤って本品を飲んだとき 【応急処置：吐かせることはせず多量の水又は牛乳、生卵を飲ませる】 (2) 誤って本品が目に入ったとき 【応急処置：水道水などのきれいな水で十分に洗い流す】 (3) 使用中または使用後に発赤、腫れ、かゆみ、灼熱感、水疱などの皮膚症状があらわれた場合

効能・効果

物品の消毒・殺菌、哺乳びん・乳首の消毒・殺菌、調理器具・食器の消毒・殺菌、室内の消毒・殺菌、浴室・便所の消毒・殺菌

用法・用量

本品で清拭する。清拭できない場合は数分間浸漬する。

さらに詳しい使用方法に関しては取扱説明書をお読みください。なお、上記の問い合わせ先にご連絡いただくか、HPからもダウンロードしていただけます。
<https://www.sankei-group.com/pdf/myklo.pdf>
右記のQRコードを読み取ってもダウンロードいただけます。



製造番号

使用期限

用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法用量を遵守し、それ以外の使用方法で使用しないでください。
- (2) 使用の際は必ず換気してください。(3) 対象物をあらかじめ十分に清拭、洗浄してから使用してください。(4) 清拭する際は本品を不織布等に染み込ませてから対象物を清拭してください。本品5mLで約1m²の消毒・殺菌が可能です。(5) 本品での清拭後、さらに水で清拭する場合は、数分間間隔を空けてください。(6) 清拭では拭き取ることが困難な複雑な構造の対象物(哺乳瓶、乳首、調理器具、食器等)は浸漬してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光が当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓したまま保管してください。(2) 小児の手の届かないところに保管してください。(3) 他の容器に入れ替えて保管しないでください。(誤用や品質劣化の原因になります。)(4) 衣類などに付着すると脱色並びに変色することもありますので十分注意してください。(5) ステンレス以外の金属製品に付着すると、サビや変色を起こすこともありますので十分に注意してください。(6) 使用期限の過ぎたものは使用しないでください。(7) 使用期限内であっても開封後は、本品の特性上、なるべく早く使用してください。(8) 開封後保管する場合はしっかりとキャップを開けてください。

包装 1000mL

製品のお問い合わせ先

製造販売元 三慶株式会社医薬品部 栃木県足利市鹿島町457
電話 0284-22-3333 FAX 0284-22-3334
受付時間：平日9時から18時まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

 ボトル、ラベル：PET
キャップ：PP
外装フィルム：PVC

飲用不可



4973-001

物品・室内・浴室・トイレの消毒・殺菌に

My
Klorus
San

マイクロラスサン

医薬部外品

注意一人体に使用しないこと

本品は希釈しないでください

使用期限：ラベル背面下部に記載

1000mL