

成分・分量 亜塩素酸水 20g/100ml (添加物として0.1mol/Lリン酸緩衝液使用)



使用上の注意



してはいけないこと

人体に使用しないこと
噴霧で使用しないこと
酸性の製品やその他の製品と混合や併用しないこと



相談すること

次の場合は直ちに使用を中止し医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- 誤って原液や希釈液を飲んだとき
[応急処置：吐かせることはせず多量の水や牛乳、生卵などを飲ませる]
- 誤って原液や希釈液が目に入ったとき
[応急処置：水道水などのきれいな水で十分に洗い流す]
- 使用中または使用後に発赤、腫れ、かゆみ、灼熱感、水泡などの皮膚症状が現れた場合

効能・効果及び用法・用量

効能・効果	用法・用量
食品製造器具の消毒・殺菌 便所の消毒・殺菌 シーツ・おむつの消毒・殺菌 室内・浴室の消毒・殺菌 調理器具・食器の消毒・殺菌 哺乳びん・乳首の消毒・殺菌 物品の消毒・殺菌	本品の8倍希釈液で清拭する 清拭できない場合は数分間浸漬する
排泄物・おう吐物の消毒・殺菌	本品の2倍希釈液を用いる

用法・用量に関連する注意

- 定められた用法・用量を遵守しそれ以外の使用方法で使用しないで下さい
- 使用の際は必ず換気して下さい
- 熱湯で希釈しないで下さい

希釈液の作成方法

- バケツなどの容器を用意して下さい
- 本品を用意しボトル上部のキャップを左に回して開封して下さい
- 本品を計量カップで量り取りこれを水で薄めて下さい(※下表を目安にして下さい)
- この希釈液は必ずかき混ぜてから使用して下さい

希釈倍率	殺菌消毒液調製時の 希釈方法		
	本品の量	水の量	全量
8倍	100mL	700mL	800mL
2倍	400mL	400mL	

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光が当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓したまま保管して下さい
- 小児の手の届かない所に保管して下さい
- 他の容器に入れ替えて保管しないで下さい(誤用や品質変化の原因になります)
- 衣類などに付着すると脱色並びに変色することもありますので十分注意して下さい
- ステンレス以外の金属製品に付着するとサビや変色を起こすこともありますので十分に注意して下さい
- 使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい
- 使用期限内であっても開封後は本品の特性上なるべく早く使用して下さい
- 希釈した液はなるべく早く使用して下さい
- 水道水で希釈して下さい

包装

製品のお問い合わせ先

1000mL 製造販売元 三慶株式会社医薬品部 栃木県足利市鹿島町 457
電話 0284-22-3333 FAX 0284-22-3334 受付時間：平日9時から18時まで(土曜日・日曜日・祭日を除く)

さらに詳しい使用方法に関しては取扱説明書をお読みください。なお、上記の問い合わせ先にご連絡いただくか、弊社HPからもダウンロードして頂けます

https://www.sankei-group.com/pdf/n_barrier.pdf



上記QRコードを読み取ってもダウンロードいただけます