

23.10.04 改訂

医薬部外品

物品・室内・浴室・トイレの消毒・殺菌に

My  
Klorus  
San

マイクロラスサン

本品は希釈しないでください

## 取扱説明書

### 目次

|                  |   |
|------------------|---|
| 成分・分量            | 1 |
| 使用上の注意           | 1 |
| してはいけないこと・相談すること | 1 |
| 効能・効果及び用法・用量     | 1 |
| 用法・用量に関連する注意     | 1 |
| 消毒・殺菌方法          | 2 |
| 消毒・殺菌対象例         | 2 |
| 保管及び取扱い上の注意      | 3 |
| 廃棄方法             | 3 |
| 包装               | 3 |
| 製品のお問い合わせ先       | 3 |

本品を正しくお使いいただくために、ご使用前に「使用上の注意」「用法・用量に関連する注意」「保管及び取扱い上の注意」を良くお読みください。  
お読みになったあとは、本品とともに保管してください。

# 成分・分量

亜塩素酸水※ 1.25 g / 100mL  
〔添加物として0.1mol/L リン酸緩衝液使用〕

※食品添加物の亜塩素酸水を使用しています。食品添加物の亜塩素酸水は、食品添加物公定書において、含量：亜塩素酸 ( $\text{HClO}_2=68.46$ ) として4.0～6.0%を含むことが規定されています。

# 使用上の注意

## ❌してはいけないこと

- (1) 人体に使用しないこと
- (2) 噴霧で使用しないこと
- (3) 酸性の製品やその他の製品と混合や併用しないこと



## ■ 相談すること

次の場合は、使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 誤って本品を飲んだとき  
〔応急処置：吐かせることはせず多量の水又は牛乳、生卵を飲ませる〕
- (2) 誤って本品が目に入ったとき  
〔応急処置：水道水などのきれいな水で十分に洗い流す〕
- (3) 使用中または使用後に発赤、腫れ、かゆみ、灼熱感、水疱などの皮膚症状があらわれた場合

# 効能・効果

物品の消毒・殺菌、哺乳びん・乳首の消毒・殺菌、調理器具・食器の消毒・殺菌、室内の消毒・殺菌、浴室・便所の消毒・殺菌

# 用法・用量

本品で清拭する。清拭できない場合は数分間浸漬する。

# 用法・用量に関連する注意


- (1) 定められた用法用量を遵守し、それ以外の使用方法で使用しないでください。
- (2) 使用の際は必ず換気してください。
- (3) 対象物をあらかじめ十分に清拭、洗浄してから使用してください。
- (4) 清拭する際は本品を不織布等に染み込ませてから対象物を清拭してください。本品5mLで約1m<sup>2</sup>の消毒・殺菌が可能です。
- (5) 本品での清拭後、さらに水で清拭する場合は、数分間間隔を空けてください。
- (6) 清拭では拭き取ることが困難な複雑な構造の対象物(哺乳瓶、乳首、調理器具、食器等)は浸漬してください。

# 消毒・殺菌方法

## 浸漬



(1) 洗浄する  
対象物をしっかり洗浄してください。



(2) 浸漬する  
対象物を浸漬してください。  
※5分くらいで消毒・殺菌出来ます。




(3) 乾燥する  
浸漬液から取り出してこれを乾燥させてください。  
※残液や残臭が気になる場合はすすいでください。


## 清拭



(1) 洗浄する  
対象物をしっかり洗浄してください。




(2) 清拭する  
本品を不織布などに染み込ませてから対象物を清拭してください。  
※本品5mLで約1m<sup>2</sup>の消毒・殺菌が可能です。  
※清拭後5分くらいで消毒・殺菌出来ます。




(3) 乾燥する  
清拭で消毒・殺菌した後水気を取り除いて乾燥させてください。  
※残液や残臭が気になる場合は水を含ませて清拭してください。

# 消毒・殺菌対象例

室内の消毒・殺菌



浴室の消毒・殺菌



※本品の濃度では、セレウス菌(芽胞)に対する効果は認められていません。なお、本品と同じ主成分を含む医薬品:「クロラス酸・Nパリア」では、セレウス菌(芽胞)に対する消毒・殺菌効果は確認済みであります。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光が当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓したまま保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えて保管しないでください。  
(誤用や品質劣化の原因になります。)
- (4) 衣類などに付着すると脱色並びに変色することもありますので十分注意してください。
- (5) ステンレス以外の金属製品に付着すると、サビや変色を起こすこともありますので十分に注意してください。
- (6) 使用期限の過ぎたものは使用しないでください。
- (7) 使用期限内であっても開封後は、本品の特性上、なるべく早く使用してください。
- (8) 開封後保管する場合はしっかりとキャップを閉めてください。

※開封後は最長3カ月を目安にできるだけ早く使い切ることをお勧めします。

## 廃棄方法

- (1) 余った薬液  
水を流して薄めながら、少しずつシンクに捨ててください。
- (2) 使い終わった空容器  
容器内を軽く水ですすいだから、各自治体の分別方法にしたがって処分してください。

## 包装

1000mL

## 製品のお問い合わせ先

製造販売元 三慶株式会社医薬品部 栃木県足利市鹿島町457  
電話 0284-22-3333 FAX 0284-22-3334  
受付時間:平日9時から18時まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)